




SZEGED



PÉCS



BUDAPEST



DEBRECEN



KARDIOVASZKULÁRIS VÉDELEM

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOK CSALÁDORVOSOK
ÉS SZAKORVOSOK RÉSZÉRE

SZEGED, HOTEL FORRÁS – **2016. FEBRUÁR 13.**

PÉCS, KODÁLY KÖZPONT – **2016. FEBRUÁR 13.**

BUDAPEST, TELEKOM SZÉKHÁZ – **2016. FEBRUÁR 20.**

DEBRECEN, KÖLCSEY KÖZPONT – **2016. ÁPRILIS 16.**

A világ első fix-dózisú perindopril-amlodipin-indapamid kombinációja^(1,2)



CO-DALNESSA®

perindopril, amlodipin és indapamid
tabletta

4 mg / 5 mg / 1,25 mg
4 mg / 10 mg / 1,25 mg
8 mg / 5 mg / 2,5 mg
8 mg / 10 mg / 2,5 mg

Co-Dalnessa® – Egyszerűen célértéken

Co-Dalnessa 4mg/5mg/1,25mg tableta, 4mg perindopril-terc-butilamin, 5mg amlodipin (amlodipin-bezilát formájában) és 1,25mg indapamid. **Co-Dalnessa 4mg/10mg/1,25mg tableta** 4mg perindopril-terc-butilamin, 10mg amlodipin (amlodipin-bezilát formájában) és 1,25mg indapamid. **Co-Dalnessa 8mg/5mg/2,5mg tableta** 8mg perindopril-terc-butilamin, 5mg amlodipin (amlodipin-bezilát formájában) és 2,5mg indapamid. **Co-Dalnessa 8mg/10mg/2,5mg tableta** 8mg perindopril-terc-butilamin, 10mg amlodipin (amlodipin-bezilát formájában) és 2,5mg indapamid tablettaiként. **Jav:** javasolt esszenciális hipertensio kezelésére azonos dózisban, egyidejűleg adott perindopril/amlodipinnel és amlodipinnel már megfelelően beállított betegek számára. **Adagolás:** A fix dózis kombináció nem használható kezdő terápiaként. Amennyiben dózismódosítás szükséges, a kombináció egyes összetevőivel külön titráltat kell végezni. Ajánlott maximális napi adagja 8mg/10mg/2,5mg. Időskorú és veseelégtelenségben szenvedő betegek esetén a perindoprilát elimináció csökken, ezért a szokásos orvosi ellenőrzés része a kreatinin- és a káliumszint gyakori ellenőrzése. Ellenjavallt súlyos veseelégtelenségben szenvedő betegek kezelésére (kreatinin clearance < 30ml/perc). Olyan betegek esetében alkalmazható, akiknél a kreatinin clearance > 60ml/perc. Ezenkél a betegnek elgyénre szabott dózisztírást javasolt az egyes összetevőkkel külön-külön. Az amlodipin plazmakoncentrációjának változása nem korrelál a veseelégtelenség mértékével. Biztonságosságát és hatásosságát nem igazolták még gyermekek és serdülőkorúak esetében. Adatok nem állnak rendelkezésre. A szokásos adag naponta egyszer egy tablettát, amit lehetőleg reggel, étkezés előtt kell bevenni. Amennyiben szükséges, a tablettát egyenlő adagokra osztható. **Ellenjav:** A perindoprilrel vagy bármilyen más ACE-gáttal, az indapamiddal vagy bármilyen más szulfonamiddal, az amlodipinnel vagy bármely más dihidropiridin származékkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Korábbi ACE-gátló kezeléssel összefüggő angioödéma a körülményben; Hereditár vagy idiopáthás angioödéma; Súlyos hypotensio; Sokk (beleértve a kardiogén sokkot is); A balkamra kiáramlást pályájának obstrukciója (pl. súlyos aorta stenosis); Akut myocardialis infarktust követő haemodinamikailag instabil szívelégtelenség; Súlyos veseelégtelenség (30ml/perc alatt) kreatinin-clearance); A 8mg/5mg/2,5mg és 8mg/10mg/2,5mg határösszegű készítmények alkalmazása közepes és súlyos veseelégtelenség esetén (ha a kreatinin-clearance < 60ml/perc) ellenjavallt. Encephalopathia hepatica; Súlyos májárosodás; Hypokalaemia; Általában szabály, hogy ennek a gyógyszernek az együttdátása nem tanácsos olyan, nem antartimális gyógyszerrel, amelyek torlódás de pontos-ot okozhatnak. A terheség másod és harmadik trimesztet. Szoptatás. A Co-Dalnessa egyidejű alkalmazása aliszin tartalmú készítményekkel ellenjavallt diabetes mellitusban szenvedő vagy károsodott veseműködésű betegnek (GFR < 60 ml/perc/1,73 m²). Kellő klinikai tapasztalat hiányában nem adható: dializált betegeknek, kezeltetlen dekompenzált szívelégtelenségben. **Mellékhat:** A perindopril

a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer gátlása révén csökkentheti az indapamid által okozott hypokalaemiát. A 4mg perindopril/1,25mg indapamid kombinációval kezelt betegek 4%-ánál észlelték hypokalaemiát. Perindopril gyakori mellékhatásai: szédülés, fejfájás, paresztésia, vertigo, ládászavarok (beleértve a diplopia-t is), álmosság, hypotensio, dyspnoe, köhögés, hasi fájdalom, hányinger, epigastriális fájdalom, hányás, dyspepsia, szájszárazság, dysgeusia, ízérzékelési zavarok, hasmenés, székrekedés, anorexia, pruritus, kiütés, maculopapuláris eruptió, izomgörcsök, asthenia. Amlodipinnel kezelt betegek esetén a leggyakrabban jelentett mellékhatások a következők voltak: aluszékonyság, szédülés, fejfájás, palpítatio, kipirulás, hasi fájdalom, hányinger, boka-duzzanat, ödéma, fáradékonyság. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg-eng. tul.:** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarjenska cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia. **Áll. érv.** 2014.11.09.

Co-Dalnessa® perindopril-amlodipin-indapamid tabletta 30x	bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatás összeg (Ft)	Tápellátás díj normatív támogatás esetén (Ft)	Közzégyen kiváltható-e
4 mg / 5 mg / 1,25 mg	1 624	898	726	✓
4 mg / 10 mg / 1,25 mg	1 725	1 070	655	✓
8 mg / 5 mg / 2,5 mg	2 646	1 539	1 107	✓
8 mg / 10 mg / 2,5 mg	2 961	1 711	1 250	✓

Az árak 2016. január 1-től érvényesek. A mindenki árakkal kapcsolatos bővebb információkat az OEP honlapján - www.oep.hu - találhat.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőéhez: Krka Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5. I/3. Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.

Incladem
Hribal V, Milovanovic J, Jarh D. Contribution of Krka's ACE inhibitors to the treatment of hypertension: 25 years of experience. Krka Med Farm 2014; 26 (DB): 14-25.
Co-Dalnessa (perindopril/amlodipin/amlodipine, 2/0,625/5 mg) Marketing Authorization No: OG/1-T-2257701-09; Co-Dalnessa (perindopril/amlodipin/amlodipine, 4/1,25/5 mg) Marketing Authorization No: OG/1-T-2257710-18; Co-Dalnessa (perindopril/amlodipin/amlodipine, 4/1,25/10 mg) Marketing Authorization No: OG/1-T-2257719-21; Co-Dalnessa (perindopril/amlodipin/amlodipine, 8/2,5/5 mg) Marketing Authorization No: OG/1-T-2257738-36; Co-Dalnessa (perindopril/amlodipin/amlodipine, 8/2,5/10 mg) Marketing Authorization No: OG/1-T-2257737-45, Hungary



Fejlesztés és tudás az egészségnek szentelve. Épp ezért kitartóan és elkötelezetten dolgozunk egyetlen cél — kiváló minőségű, hatásos és biztonságos gyógyszer fejlesztése érdekében.




Tisztelt Kolléga!

A Krka Magyarország Kft. évek óta kiszámítható együttműködő partnere az egészségügy szereplőinek, és a jövőben is aktívan szeretnénk hozzájárulni a háziorvosok, szakorvosok magas szintű szakmai képzéséhez.

2016-ra tervezett programunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az egyes szakterületek kiváló szakembereit nyerjük meg előadónak, és olyan témákat tűzzünk napirendre, amelyek az Önök gyakorlati munkájához nyújtanak segítséget. Hisszük, hogy az ismeretek bővítése, az orvosi munka során szükséges gondolkodásmód kiterjesztése hozzájárulhat az eredményes gyógyító munkához.

Ezt kívánjuk elősegíteni továbbképzéseinkkel, akkreditált tanfolyamainkkal, valamint kiváló minőségű, megbízható termékeinkkel.

dr. Valiskó Gyöngyi
marketing menedzser



TERVEZETT PROGRAM

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2016. február 13.

**Szeged, Hunguest Hotel Forrás
(6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.,
www.hotelforras.hunguesthotels.hu)**

Üléselnökök: *Prof. Dr. Forster Tamás DSc*,
tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója

09:00 – 09:45

Nyerő kombinációk

Prof. Dr. Ábrahám György PhD,
tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika
igazgatója

09:45 – 10:30

Kardiovaszkuláris kockázatok mérlegelése

Dr. Légrády Péter PhD,
egyetemi adjunktus
SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika

10:30 – 11:15

Gasztro protekció

Dr. med. habil Róka Richárd PhD, egyetemi adjunktus
SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika

11:15 – 11:35

Kávészünet

11:35 – 12:20

Kardiovaszkuláris rizikó csökkentésének lehetőségei diabétесben és előállapotaiban

Dr. med. habil Lengyel Csaba PhD, egyetemi docens
SZTE I sz. Belgyógyászati Klinika

12:20 – 13:05

Vulnerábilis plakk

Dr. Jambrik Zoltán osztályvezető főorvos, Ph.D
Pándy Kálmán Kórház, Gyula

13:05 – 13:50

Szupergenerikum védelmében


Krka orvoslátogató

13:50 – 14:00

Tesztírás

14:00

Ebéd



A Semmelweis Egyetem a PTE ÁOK/2016.I./00054 kódszámú tanfolyamot akkreditálta.

**A tanfolyam pontértéke orvosok részére - sikeres tesztírás esetén - 12 pont,
s a kreditpontok az OFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknekél
szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.**

**A NEFMI 64/2011. (11.29) rendelete értelmében az a résztvevő, aki a vizsgával minősített
tanfolyamon nem vizsgázik le, a tanfolyam minősítésekor megítélt kreditpontot nem
kaphatja meg - tehát mint hallgató - részpontszámot sem kaphat.**

TERVEZETT PROGRAM

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2016. február 13.

Pécs, Kodály Központ

(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.,

www.kodalykozpont.hu)

Üléselnökök: *Prof. Dr. Tóth Kálmán,*
az MTA doktora

PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója

09:00 – 09:45 **Vulnerábilis plak**
Dr. Komócsi András,
egyetemi docens, az MTA doktora
PTE KK Szívgyógyászati Klinika

09:45 – 10:30 **Gasztroprotekcio**
Dr. Bajor Judit klinikai főorvos
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika

10:30 – 11:15 **Célszervvédelem**
Dr. Halmosi Róbert
egyetemi docens, Ph.D., med. habil.
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika

11:15 – 11:35 Kávészünet

11:35 – 12:20 **Kockázatok mérlegelése**
Prof. Dr. Bajnok László egyetemi tanár, Ph.D.
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika

12:20 – 13:05 **Nyerő kombinációk**
Dr. Habon Tamás egyetemi docens, Ph.D., med. habil.
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika

13:05 – 13:50 **Szupergenerikum védelmében**
Krka orvoslátogató

13:50 – 14:00 Tesztírás

14:00 Ebéd



A Semmelweis Egyetem a PTE ÁOK/2016.I./00055 kódszámú tanfolyamot akkreditálta.

**A tanfolyam pontértéke orvosok részére - sikeres tesztírás esetén - 12 pont,
s a kreditpontok az OFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknél
szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.**

**A NEFMI 64/2011. (11.29) rendelete értelmében az a résztvevő, aki a vizsgával minősített
tanfolyamon nem vizsgázik le, a tanfolyam minősítésekor megítélt
kreditpontot nem kaphatja**

TERVEZETT PROGRAM


Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 300 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2016. február 20.

**Budapest, TELEKOM Székház
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)**

Üléselnökök: *Prof. Dr. Merkely Béla*
az MTA Doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
SE Kardiológiai Központ igazgatója



- | | |
|---------------|---|
| 09:00 – 09:45 | Ritmuszavarok korszerű kezelési lehetőségei
<i>Dr. Gellér László Ph.D. med. habil.</i>
osztályvezető egyetemi docens
SE Kardiológiai Központ |
| 09:45 – 10:30 | Amit a vulnerabilis plaque okozhat: Acut coronaria syndroma
<i>Dr. Becker Dávid</i> egyetemi docens, Ph.D
SE Kardiológiai Központ |
| 10:30 – 11:15 | RAAS-gátló kezelés – alappillér a kardiológiában
<i>Dr. Nagy Viktor</i> , Osztályvezető Klinikai Főorvos
Semmelweis Egyetem ÁOK II. Belgyógyászati Klinika |
| 11:15 – 11:35 | Kávészünet |
| 11:35 – 12:20 | Nyerő kombinációk
<i>Prof. Dr. Járai Zoltán</i> c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház |
| 12:20 – 13:05 | Legújabb statin irányelvek
<i>Prof. Dr. Karádi István</i> klinika igazgató egyetemi tanár, az MTA Doktora
SE III. Belgyógyászati Klinika |
| 13:05 – 13:50 | Vulnerabilis plakk
<i>Prof. Dr. Merkely Béla</i> klinika igazgató egyetemi tanár, az MTA Doktora |
| 13:50 – 14:35 | Szupergenerikum védelmében
<i>Krka orvoslátogató</i> |
| 14:35 – 14:45 | Tesztírás |
| 14:45 | Ebéd |

A Semmelweis Egyetem a PTE ÁOK/2016.I./00056 kódszámú tanfolyamot akkreditálta.
A tanfolyam pontértéke orvosok részére - sikeres tesztírás esetén - 12 pont,
s a kreditpontok az OFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknél
szakma szerinti kötelező pontszámként kerülnek jóváírásra.

A NEFMI 64/2011. (11.29) rendelete értelmében az a résztvevő, aki a vizsgával minősített tanfolyamon nem vizsgázik le, a tanfolyam minősítésekor megítélt kreditpontot nem kaphatja meg - tehát mint hallgató - részpontszámot sem kaphat.

TERVEZETT PROGRAM


Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2016. április 16.

**Debrecen, Kölcsey Központ
(4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.,
www.kolcseykozpont.hu)**

Üléselnökök: *Prof. Dr. Édes István*,
egyetemi tanár, az MTA Doktora
DE KK Kardiológiai Intézet igazgatója



09:00 – 09:45 **Kockázatok mérlegelése**

Prof. Dr. Czuriga István
c. egyetemi tanár, Ph.D.
DE KK Kardiológiai Intézet

09:45 – 10:30

Nyerő kombinációk

Prof. Dr. Páll Dénes,
egyetemi tanár, az MTA Doktora
DE KK Belgyógyászati Intézet



10:30 – 11:15

Vulnerábilis plakk

Dr. Szűk Tibor, egyetemi adjunktus, Ph.D.
DE KK Kardiológiai Intézet

11:15 – 11:35

Kávészünet

11:35 – 12:20

Gasztro protekció

Prof. Dr. Altorjay István egyetemi tanár, az MTA Doktora
DE KK Belgyógyászati Intézet

12:20 – 13:05

ARB + statin kezelés előnyei

Dr. Fülöp Tibor, egyetemi adjunktus, Ph.D.
DE KK Kardiológiai Intézet

13:05 – 13:50

Szupergenerikum védelmében

Krka orvoslátogató

13:50 – 14:00

Tesztírás

14:00

Ebéd

A Semmelweis Egyetem a PTE ÁOK/2016.I./00053 kódszámú tanfolyamot akkreditálta.

**A tanfolyam pontértéke orvosok részére - sikeres tesztírás esetén - 12 pont,
s a kreditpontok az OFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknél
szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.**

**A NEFMI 64/2011. (11.29) rendelete értelmében az a résztvevő, aki a vizsgával minősített
tanfolyamon nem vizsgázik le, a tanfolyam minősítésekor megítélt kreditpontot nem
kaphatja meg - tehát mint hallgató - részpontszámot sem kaphat.**

Jegyzet

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.

Jegyzet

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.



Szervezési információ/Technikai információ:

Horvát Renáta

Convention Budapest Kft.

Tel: (061) 299-0184, (061) 299-0185, (061) 299-0186,

Fax. (061) 299-0187

e-mail: rhovrat@convention.hu

on-line regisztráció: www.convention.hu

10 éves
a KRKA
Prenessája

PRENESSA® CO-PRENESSA®

perindopril és indapamid
4 mg / 1,25 mg, 8 mg / 2,5 mg tabletta

Prenessa 4mg, 8mg tabletta. 4 mg perindopril terc-butilamin, 8 mg perindopril terc-butilamin. Laktozot tartalmaz. **Jav:** Hypertonia; tünetekkel járó szívelégtelenség kezelése. **Mi-on és/vagy** revascularizációt átesett betegeknek a cardialis események kockázatának csökkentése. **Adagolás:** Naponta egyszer, reggelként, étkezés előtt ajánlott bevenni. Hypertonia: Monoterápiában vagy más típusú vérnyomáscsökkentővel kombinálva alkalmazható. A javasít kezdő adag 4 mg naponta egyszer, reggelente. A renin-angiotenzin átalakító rendszer nyomásmérő aktivációja esetén különösen revascularizációs hipertóniában, sz-és/vagy volumenhiány esetében, szívelégtelenségben, vagy súlyos hipertóniában) a készítmény kezdetben túlzott mértékű vérnyomásesést idézhet elő. Ilyen esetekben ajánlott 2 mg-os kezdő dózissal, orvosi felügyelet mellett elkezdni a kezelést. Egy hónap után a napi adag 1-8 mg-ra növelhető. Tünetekkel járó hypertonia alakulhat ki a perindopril kezelés kezdete után, főként azoknál a betegeknél, akik egyidejűleg diuretikumot szednek. Fentiek miatt óvatossággal ajánlott, mert ezeknél a betegeknél hypovolemia és/vagy sóhiány állhat fenn. A perindopril adagolásának elkezdése előtt 2-3 nappal ajánlott abbahagyni a diuretikum szedését. Azoknál a hypertóniás betegeknél, akiknél a diuretikumot nem lehet abbahagyni, 2 mg perindoprilrel kell elkezdni a kezelést. A veseműködés és a szérum káliumcímért ellenőrizni kell. A dózist a továbbiakban a mért vérnyomásmérések alapján kell módosítani. Ha szükséges, a diuretikum kezelést újra el lehet kezdeni. **Ellenjav:** Gy. érz.; ACE-gátló kezeléssel összefüggő angioneurotikus oedéma a közelműködésben. Hereditár vagy idiopathiás angiooedéma. Terhesség. Szoptatás nem javasolt. **Mellékz:** fejfájás, szédülés, vertigo, paraesthesia, látászavar, fülcsörgés, hypotonia, köhögés, dyspnoe, érzékenység, hányás, hasi fájdalom, ízvesztés, dyspepsia, hasmenés, székrekedés, bőrkisülés, viszketés, izomgörcsök, asthma. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg. eng. tulz.:** KRKA Polisz Sp. z o.o., ul. Równolegla 5, 02-235 Varsó, Lengyelország. **Alk. érv:** 2014.11.22.

Co-Prenessa 4mg/1,25 mg tabletta, 8mg/2,5 mg tabletta. 4 mg perindopril terc-butilamin és 1,25 mg indapamid, illetve 8 mg perindopril terc-butilamin és 2,5 mg indapamid tablettenként. Laktozot tartalmaz. **Jav:** 4 mg/1,25 mg tabletta: esszenciális hypertonia kezelése, ha a perindopril önmagában nem volt elegendő a vérnyomás beállítására. 8 mg/2,5 mg tabletta: esszenciális hypertóniás betegek esetében javult, akiknél az ugyanilyen dózisban együttesen alkalmazott perindopril és indapamid kezelés megfelelő vérnyomásmérővel biztosított. **Adagolás:** 4 mg/1,25 mg tabletta: A szokásos adag napi egy 4 mg/1,25 mg tabletta, lehetőleg reggel, étkezés előtt. Közepesen súlyos vesekárosodás esetén (creatinin-clearance 30-60 ml/min), perindopril napi maximum dózis: 2 mg. Időskorúaknak: kezdőadag napi egyszeri Co-Prenessa 2mg/0,625mg tabletta, lehetőleg reggel, étkezés előtt. A perindopril adagja óvatosságnál 4 mg-ra emelhető. 8 mg/2,5 mg tabletta: A szokásos adag napi 1x1 Co-Prenessa 8mg/2,5mg tabletta, lehetőleg reggel, étkezés előtt. Időskorú betegeket csak abban az esetben szabad kezelni, ha normális a vesefunkciójuk és mélylegtek a várható vérnyomás-változat. **Ellenjav:** Gy. érz.; Angiodéma (Quincke-féle oedéma), korábbi ACE-gátló kezelés során; orokletes vagy idiopathiás angiooedéma; terhesség 2. és 3. trimesztere, szoptatás. Súlyos vagy mérsékelt fokú vesekárosodás (creatinin-clearance < 30 ml/perc), hepaticus encephalopathia, súlyos májcirrózis, hypokalémia. A gyógyszer együttes alkalmazása nem tanácsos olyan nem antitartós gyógyszerekkel, amelyek torlasd de pinter-ot olcshatnak. Nem alkalmaz-

ható dializált betegeknél, kezdetlen dekompenzált szívbetegségben. **Mellékz:** A kezelés során rendszerint száraz, improduktív köhögés jelentkezik, ami abbahagyás után spontán megszűnik. Ha köhögés jelentkezik, látogatói etiologiára is gondolni kell. Székrekedés, szájszárazság, érzékenység, epigastriális fájdalom, étvágytalanság, hasi panaszok, izérzés zavara. 8mg/2,5mg tabl. esetében: paraesthesia, fejfájás, gyengeség, szédülés, vertigo, látás zavarok, tinnitus, dyspnoe, hypotonia, hányinger, hányás, anorexia, dyspepsia, diarrhoea, kiülés, pruritis, maculopapularis eruptio, izomgörcsök, általános gyengeség. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg. eng. tulz.:** KRKA Polisz Sp. z o.o., Lengyelország. **Alk. érv:** 2015.01.16.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogysztói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Készítmény kiváltható-e
PRENESSA 8 mg tabletta 30x	1 608	673	935	—
CO-PRENESSA 4 mg / 1,25 mg tabletta 30x	1 712	679	1 033	—
CO-PRENESSA 8 mg / 2,5 mg tabletta 30x	1 870	1 320	550	✓

Az árak 2016. január 1-jétől érvényesek. A mindenkori aktuális árakkal kapcsolatos bővebb információkat az OEP honlapján - www.oep.hu - találhat.

PRENESSA 4 mg tabletta 30x ajánlott fogysztói ára 1061 Ft

Szabadhasználati készítmény. A nem támogatott gyógyszerek szabadhasználat, az árképzés a nagykereskedőnél és a gyógyszerártól függ.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviseletéhez: KRKA Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5./3. Tel: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.



Fejlesztés és tudás az egészségnek szentelve. Épp ezért kitartóan és elkötelezetten dolgozunk egyetlen cél — kiváló minőségű, hatásos és biztonságos gyógyszer fejlesztése érdekében.



A Roxera hatékonyságát a Rosu-path, saját klinikai vizsgálat is bizonyítja.⁽²⁾

[illegible]

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviseletéhez:
Kika Magyarország Kft., 1036 Budapest, Párcsátréti utca 5./3. Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.

Fejlesztés és tudás az egészségnek szentelve. Épp ezért kitartóan és elkötelezetten dolgozunk egyetlen cél — kiváló minőségű, hatásos és biztonságos gyógyszer fejlesztése érdekében.